

## 表的要求

表格用三线表，两端开口，不用纵线，栏头左上角不用斜线。纵表头是纵向排列的对表格各行单元格内容进行概括和提示的栏目，横表头是横向排列的对表格各列单元格内容进行概括和提示的栏目。表的编排一般是内容和测试项目由左向右横读，数据依序竖读。表中各栏标明标目词，参数栏的标目词一般为量或测试项目及其单位。表内数据要求同一指标有效位数一致。表题及标目词均用中文表示，不用英文。表号与表题之间间隔一个中文字符，表题连同表号置于表的上方，表注置于表的下方，并以句号“。”结尾；表头中量和单位的标注形式应为“量的名称或符号/单位符号”。少于9个数据不用表，可用文字叙述。

若表中所有参数的单位相同，单位可标注在表的右上方（表题的下一行），单位前不加斜线“/”；若各栏参数的单位不同，则应将单位前加“/”，标注在各栏目词后，标目词和单位之间如需换行，“/”放到上一行的行尾；表中不设“备注”栏；表内不宜用“同上”“同左”等类词，应一律填入具体数字（包括“0”）或文字；表内“空白”代表无此项，若用符号“—”代表“未测”或“未发现”，应在表格下方以表注的形式体现；表中的未检出如果需要用缩写表示，则统一用“ND”；统计表中应列出样本数；平方和（ $SS$ ）、自由度（ $f$ ）、均方差（ $Ms$ ）在表中均用中文表示；表和图之间不能用“下同”；表

中某些行与上面各行表述内容不同时，需在该行上方加入辅助线。如下示例：

表 2 4 种石斛花蛋白的氨基酸评分(AAS)和化学评分(CS)

必需氨基酸	FAO 评分模式/ mg·g <sup>-1</sup>	标准鸡蛋蛋白/ mg·g <sup>-1</sup>	AAS				CS			
			金钗	鼓槌	铁皮	紫皮	金钗	鼓槌	铁皮	紫皮
Thr	40	51	1.34	1.41	1.42	1.35	1.05	1.10	1.11	1.06
Val	50	73	1.21	0.67	1.27	1.25	0.83	0.46	0.87	0.85
Met + Cys	35	55	0.58*	0.10*	0.12*	0.19*	0.37*	0.06*	0.08*	0.12*
Ile	40	66	1.29	0.22	1.36	1.43	0.78	0.13	0.83	0.87
Leu	70	88	1.37	0.23	1.40	1.39	1.09	0.18	1.12	1.11
Phe + Tyr	60	100	1.53	0.76	1.71	1.63	0.92	0.46	1.03	0.98
Lys	55	64	1.26	0.61	1.15	1.29	1.08	0.52	0.99	1.10
Trp	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—
总评分			1.23	0.55	1.23	1.24	0.86	0.38	0.86	0.87

注：\*表示所对应的氨基酸为第一限制氨基酸；—表示未检出。

表中如有均值加减标准差 ( $\bar{x} \pm s$ ) 一定要标明样本量。即在表题后面加括号“( )”，括号中注明“(  $\bar{x} \pm s$ ,  $n$ =样本量) ”。

表 1 水蛭样品的  $\alpha$  多样性指数分析 ( $\bar{x} \pm s$ ,  $n=3$ )

样品编号	DNA 序列数/个	Chao1 指数	Shannon 指数	Simpson 指数
M1	4263	18.80±1.40	0.68±0.14**	0.17±0.04**
M2	9027	28.83±9.77	2.53±0.65	0.74±0.10
B1	7227	13.11±3.40	1.39±0.37*	0.45±0.12*
B2	8896	36.76±6.08	2.88±0.62	0.79±0.08

注：不同养殖组同一类组织样本比较，\* $P < 0.05$ ，\*\* $P < 0.01$ 。

以人为观察对象，不用“ $n$ ”表示，用“例数”表示；按伦理规范要求，表中如果涉及动物数，则标目词用“动物数”，不用“ $n$ ”，如下示例：

动物数

表 1 B4 对顺铂所致小鼠急性肾功能损伤的影响 ( $\bar{x} \pm s$ )

组别	剂量/ $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	<i>n</i>	TP/ $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$	BUN/ $\text{mg} \cdot \text{dL}^{-1}$	Cre/ $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
正常		10	49.6 ± 2.3	25.1 ± 4.3	25.6 ± 4.0
模型		15	48.3 ± 3.2	62.0 ± 31.0 <sup>#</sup>	29.7 ± 3.7 <sup>#</sup>
B4	10.0	12	46.2 ± 2.5	38.1 ± 18.9 <sup>*</sup>	25.4 ± 7.1 <sup>*</sup>
B4	5.0	12	46.6 ± 2.3	28.4 ± 14.3 <sup>*</sup>	24.1 ± 3.8 <sup>*</sup>
B4	2.5	12	47.6 ± 2.5	69.3 ± 45.8	29.3 ± 5.7
地塞米松	0.5	12	52.9 ± 2.5 <sup>**</sup>	36.4 ± 20.4 <sup>*</sup>	30.1 ± 3.9

注: 与正常组比较, <sup>#</sup> $P < 0.05$ ; 与模型组比较, <sup>\*</sup> $P < 0.05$ , <sup>\*\*</sup> $P < 0.01$ 。

中国现代中药